BSc PHY – Angewandte Statistik

LE2 Zuallsvariablen und Verteilungen

Patric Eichelberger & Aglaja Busch
aF&E Physiotherapie

✉ patric.eichelberger@bfh.ch | aglaja.busch@bfh.ch
🌐 Moodlekurs

29. Juli 2025

Intro

Verteilung von
Zuallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Intro

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Rückblick LE1 Deskriptive Statistik

- ▶ Es muss zwischen der Grundgesamtheit und einer betrachteten Stichprobe unterschieden werden.
- ▶ Eine Stichprobe ist nicht zwingend repräsentativ was die Gültigkeit einer Statistik stark beeinflussen kann.
- ▶ Wir unterscheiden zwischen beschreibender und schliessender Statistik sowie quantitativen (rational- und intervallskaliert) und qualitativen (nominal, ordinal) Merkmalen.
- ▶ Wir benötigen graphische Werkzeuge wie Balkendiagramm, Histogramm und Boxplot um Daten visuell zu beschreiben.
- ▶ Wir haben Lage- (Mittelwert, Median, Perzentile) und Streumasse (Varianz, Spannweite, IQR) gesehen um Daten zusammenfassend mit Zahlen zu beschreiben.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Lernziele Zufallsvariablen und Verteilungen

- ▶ Die Studierenden erläutern den Begriff der Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Häufigkeiten und Verteilungen.
- ▶ Die Studierenden erläutern die Bedeutung und die Merkmale der Normalverteilung.
- ▶ Die Studierenden berechnen Wahrscheinlichkeiten und Quantile der Normalverteilung.
- ▶ Die Studierenden beurteilen die Normalverteilung einer Variablen anhand eines QQ-Plots.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Verteilung von Zufallsvariablen

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Zufallsvariablen

Eine **Zufallsvariable** beschreibt das Ergebnis eines Zufallsexperiments.
Zufallsvariablen werden häufig mit X bezeichnet, das Ergebnis davon mit x .

Beispiele

- ▶ Einen (fairen) Würfel werfen.
- ▶ Die Körpergrösse einer zufällig ausgewählten Person.
- ▶ M&M's ziehen.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Verteilung einer Zufallsvariablen

Die Verteilung einer Zufallsvariablen gibt an, wie wahrscheinlich welches Ergebnis ist.

Beispiel 1

Die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Augenzahl zu bekommen ist immer gleich (Gleichverteilung).

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
P(Augenzahl)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Beispiel 2

Verteilung von Farben von M&M's sind nicht gleichverteilt

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

1x M&M's ziehen

Color	N	Prop
blue	79	0.22
brown	44	0.12
green	46	0.13
orange	69	0.19
red	47	0.13
yellow	75	0.21

Die relative Häufigkeit in der Stichprobe:
Wahrscheinlichkeit ein M&M's der Farbe
zu ziehen.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

N-mal M&M's ziehen

PDF drawing 20 M&M's

PDF drawing 50 M&M's

PDF drawing 100 M&M's

PDF drawing 200 M&M's

PDF drawing 300 M&M's

PDF drawing 360 M&M's

Urnenmodell ohne Zurücklegen » hypergeometrische Verteilung

Verteilung einer Zufallsvariablen (cont.)

Beispiel 3

Mittlere Augenzahlsumme bei mehr als einem Würfel ist normalverteilt.

Intro

Verteilung von Zufallsvariablen

Dichte- und Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Verteilung einer Zufallsvariablen (cont.)

Beispiel 4

Körpergröße folgt einer Normalverteilung

Beschrieb von Verteilungen mittels **Dichte-**, **Verteilungs-** und **Quantilfunktion**. Alle drei sind gleichwertig.

Dichte- und Verteilungsfunktion

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Dichte- und Verteilungsfunktion

Ein Histogramm schätzt die Dichtefunktion (auch Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion/Eng. probability density function PDF) f (blaue Kurve).

Die empirische Verteilungsfunktion F_n schätzt die Verteilungsfunktion (auch kumulative Verteilungsfunktion/Eng. cumulative distribution function CDF) F (blaue Kurve).

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Dichte- und Verteilungsfunktion (cont.)

- ▶ Bedeutung der Verteilungsfunktion der Variable X :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- ▶ Wenn z.B. X die Körpergröße von ist, ist $F(165)$ die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person kleiner oder gleich 165 cm gross ist.
- ▶ Die Verteilungsfunktion an der Stelle x ist die Fläche unter der Dichtefunktion bis zu Stelle x .

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Normalverteilung

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Zentraler Grenzwertsatz: Galtonbrett

Quelle: wikipedia.org

Merke

Der Mittelwerte einer genügend grossen Anzahl Zufallsexperimente ist näherungsweise normalverteilt.

- ▶ Zufallsexperiment im Bild: Nach rechts oder links fallen über sechs Ebenen.
- ▶ Wiederholung mit unendlich vielen Kugeln führt zu einer Normalverteilung über die Fächer.
- ▶ Praktische Beispiele: (i) Zufälliger Messfehler bei wiederholten Messungen, (ii) Ziehen von zufälligen Stichproben aus einer Population

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Übung M&Ms ziehen: Gewicht

Beobachtung

Die Streuung der Stichprobenmittelwerte wird kleiner wenn die Stichproben grösseren Umfang haben.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Übung M&Ms ziehen: Farben

Color	N	Prop
blue	79	0.22
brown	44	0.12
green	46	0.13
orange	69	0.19
red	47	0.13
yellow	75	0.21

Beobachtung

Die Streuung der Stichprobenmittelwerte wird kleiner wenn die Stichproben grösseren Umfang haben.

Zentraler Grenzwertsatz: Stichprobenmittelwerte

$n = 400, \mu = 173.2, \sigma = 10.4$

Der Mittelwert einer genügend grossen Anzahl Zufallsexperimente ist näherungsweise normalverteilt.

40 Mittelwerte von Stichproben mit Umfang $n = 15$
Mean = 173.39, SD = 2.98, SE (theoret.) = 2.7

40 Mittelwerte von Stichproben mit Umfang $n = 40$
Mean = 173.13, SD = 1.77, SE (theoret.) = 1.65

Stichprobenumfang $\longrightarrow$ Grösser

Verteilung der Mittelwerte $\longrightarrow$ Normaler und schmaler

Gewicht M&M's: 50 Stichproben

Population

Stichproben

- ▶ Gleiches Schema wie Übung aber mit $N = 20$ und $N = 40$
- ▶ Mit 50 Stichprobenmittelwerten macht ein Histogramm Sinn
- ▶ Annäherung Stichprobenmittelwerte an Normalverteilung

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Farben M&M's: 50 Stichproben

Population

Stichproben

- ▶ Farbproportionen in Population offensichtlich nicht normalverteilt
- ▶ Stichprobenmittelwerte hingegen schon bei genügend grossen Stichproben

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Normalverteilung

Die Normalverteilung, auch Gaussverteilung oder Gausssche Glocke genannt, spielt eine sehr wichtige Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik:

- ▶ Mittelwerte von genügend vielen unabhängigen Zufallsexperimenten sind annäherungsweise normalverteilt (nach dem sogenannten zentralen Grenzwertsatz).
- ▶ Zufällige Messfehler sind bei einigen Versuchen (z.B. physikalische Laborversuche) annäherungsweise normalverteilt.
- ▶ Einige quantitative Merkmale sind normalverteilt (z.B. Körpergrösse nach Geschlecht).
- ▶ Für normalverteilte Variablen gelten besonders einfache mathematische Sätze.

Aus diesen Gründen gibt es viele Tests und Schätzer, die die Normalverteilung als Voraussetzung haben.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Normalverteilung (cont.)

- ▶ Die Normalverteilung hat die zwei Parameter μ (Mittelwert) und σ (Standardabweichung).
- ▶ Der Spezialfall mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ führt zur Standard-Normalverteilung.
- ▶ Die Normalverteilung ist eine symmetrische Verteilung.

z-Transformation: Umrechnung in Standard-Normalverteilung

$$z_n = \frac{x_n - \mu}{\sigma}$$

Dichte der Normalverteilung

Annahme: Körpergröße in der Population ist normalverteilt mit Mittelwert $\mu = 169$ cm und Standardabweichung $\sigma = 7$ cm.

Weitere wichtige z-Werte

z	Fläche
1.96	95%
2.58	99%
3.29	99.9%

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Zusammenhang Quantile und Verteilungsfunktion

Das α -Quantil ist die Umkehrfunktion von der Verteilungsfunktion an der Stelle α .

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Beurteilung von Verteilungen

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Schiefe (Skewness): Asymmetrie

Normalverteilung, Skew: 0.07 , Kurt: 0.08

Schief-Negativ, Skew: -0.71 , Kurt: 0.37

Schief-Positiv, Skew: 0.66 , Kurt: 0.25

Kennzahl misst die Asymmetrie

- ▶ < 0 : linksschief, rechtssteil
- ▶ > 0 : rechtsschief, linkssteil

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Wölbung (Kurtosis): Spitzigkeit

- ▶ < 0 : Flacher und breiter als Normalverteilung
- ▶ > 0 : Steiler und schmäler als Normalverteilung

Flachgipflig, Skew: 0.05 , Kurt: -0.5

Steilgipflig, Skew: -0.05 , Kurt: 0.36

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Modus

- ▶ Wert der am häufigsten in einem Datensatz vorkommt.
- ▶ ACHTUNG: es kann mehrere Moden geben (hier bimodal)

QQ-Plot

- ▶ Zur Beurteilung, ob Daten normalverteilt sind, benutzen wir das sogenannte Quantil-Quantil-Diagramm, kurz QQ-Plot.
- ▶ Darin werden die geordneten Stichprobenwerte (schwarze Punkte) gegen die theoretischen Quantile (blaue Linie) der Standardnormalverteilung aufgetragen.
- ▶ Wenn die Daten **normalverteilt** sind, sollten alle **Punkte auf einer Geraden** liegen.
- ▶ **ACHTUNG:** Ein QQ-Plot kann erst ab einer Stichprobengröße von mindestens 30 eingesetzt werden!¹

¹Razali N. M. and Wah Y. B. (2011) J Stat Mod Ana, 2(1), 21-33

QQ-Plot: Beispiele

Normalverteilung

Normalverteilung, Skew: 0.07, Kurt: 0.08

Normalverteilung, Skew: 0.07, Kurt: 0.08

Normalverteilt

Schief negativ

Schief-Negativ, Skew: -0.71, Kurt: 0.37

Schief-Negativ, Skew: -0.71, Kurt: 0.37

Nicht normalverteilt

Steilspitzig

Steilspitzig, Skew: -0.05, Kurt: 0.36

Steilspitzig, Skew: -0.05, Kurt: 0.36

Nicht normalverteilt

Gleichverteilung

Gleichverteilung

QQ-Plot Gleichverteilung

Nicht normalverteilt

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Andere wichtige Verteilungen

Poisson-Verteilung bei Zählgrößen:
Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eine bestimmte Anzahl Male passiert.

Exponentialverteilung bei Zeitintervallen:
Wahrscheinlichkeit der Zeitdauer bis zum Eintreten eines Ereignisses.

Orendurf et al. 2008 J Rehab Res Dev

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Praxis mit R

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

QQ-Plot Körpergrösse

Datengrundlage: KennzahlenKoerpergroesse_M_F.xlsx

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Wahrscheinlichkeit Körpergrösse

Nehmen wir an die Körpergrösse sei normalverteilt mit Mittelwert 169 cm und Standardabweichung 7 cm.

Aufgabe

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person kleiner oder gleich 160 cm gross ist?

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Wahrscheinlichkeit Körpergrösse in Jamovi

`pnorm(160, mean=169, sd=7)`

Wir erhalten 0.1, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person kleiner oder gleich 160 cm gross ist 10%.

The screenshot shows the Jamovi software interface with the following components:

- 1. R Code Sektion einfügen:** The 'R' icon in the top toolbar is circled in red.
- 2. Befehlszeile eingeben:** The R Editor window contains the following code:

```
1 # Annahme: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit
2 # einem Mittelwert von 169 cm und einer Standardabweichung
3 # von 7 cm
4
5 # Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person
6 # kleiner oder gleich 155 cm gross ist
7 pnorm(160, mean=169, sd=7)
```

Annotations indicate that lines starting with '#' are comments and are ignored by R.
- 3. Code mit Klick auf "Play" ausführen:** A 'Play' button (a right-pointing arrow) is located to the right of the code editor.
- 4. Resultat:** The R console displays the result:

```
[1] 0.0992714
```
- Figure:** A 'Theoretical Quantiles' plot is shown on the right side of the interface, displaying a normal distribution curve.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Quantile Körpergrösse

Nehmen wir an die Körpergrösse sei normalverteilt mit Mittelwert 169 cm und Standardabweichung 7 cm.

Aufgabe

Wie gross ist das 20%-Quantil der Verteilung der Körpergrössen?

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Quantile Körpergrösse in Jamovi

`qnorm(0.2, mean=169, sd=7)`

Wir erhalten 163.1 cm. Wenn eine Normalverteilung mit den gegebenen Parametern vorliegt sind also 20% der Personen kleiner oder gleich 163.1 cm.

The screenshot shows the Jamovi software interface. On the left, a data table titled 'Grösse' contains 20 rows of body height measurements. The 'Analyses' menu is open, showing various statistical tools. The 'Rj Editor' window is active, displaying an R script with a comment in German and a call to the `qnorm` function. The output window shows the result of the function call.

Grösse
157
173
160
168
165
170
160
176
170
170
171
167
175
173
160
170
163
169
164
180

```
Rj Editor
1 # Annahme: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit
2 # einem Mittelwert von 169 cm und einer Standardabweichung
3 # von 7 cm
4
5 # 10% Quantil der Verteilung der Körpergrössen
6 qnorm(0.2, mean=169, sd=7)
```

```
R
> # Annahme: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit
> # einem Mittelwert von 169 cm und einer Standardabweichung
> # von 7 cm
> # Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person
> # kleiner oder gleich 155 cm gross ist
> pnorm(160, mean=169, sd=7)

[1] 0.0992714

R
> # Annahme: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit
> # einem Mittelwert von 169 cm und einer Standardabweichung
> # von 7 cm
> # 10% Quantil der Verteilung der Körpergrössen
> qnorm(0.2, mean=169, sd=7)

[1] 163.1087
```

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- ▶ Ein einfaches Zufallsexperiment ist einen (fairen) Würfel werfen, dessen Ergebnis gleichverteilt ist.
- ▶ Merkmale sind **oft nicht gleichverteilt**. Deren Verteilung kann mittels Histogramm geschätzt werden.
- ▶ Die Normalverteilung spielt eine zentrale Rolle da viele Merkmale **oft normalverteilt** sind.
 - ▶ $\mu \pm \sigma \Rightarrow 68.3\%$ der Daten
 - ▶ $\mu \pm 2\sigma \Rightarrow 95.5\%$ der Daten
 - ▶ $\mu \pm 3\sigma \Rightarrow 99.7\%$ der Daten
- ▶ Die Normalverteilung ist eine Grundvoraussetzung für viele statistische Tests und Schätzer, welche über einen QQ-Plot beurteilt werden kann.

Intro

Verteilung von
Zufallsvariablen

Dichte- und
Verteilungsfunktion

Normalverteilung

Beurteilung von
Verteilungen

Praxis mit R

Zusammenfassung